

Mobile Impfaktionen

in der Samtgemeinde



Esterwegen, Infozentrum, Dorfplatz 2 14:00 Uhr – 17:00 Uhr	Surwold, Mehrgenerationenhaus, Schulstraße 14:00 – 17:00 Uhr
Freitag, 02.12.2022	Freitag, 09.12.2022

Das jetzige Covid-19-Impfangebot der mobilen Impfteams richtet sich generell an alle Personen ab 12 Jahren, die noch keine 1. Auffrischungsimpfung (3. Impfung) erhalten haben und besonders auch an alle sog. „vulnerablen“ Personengruppen ohne 2. Auffrischungsimpfung (4. Impfung). Dazu zählen ab 60-Jährige, chron. Vorerkrankte, Immungeschwächte und deren direkte Kontaktpersonen (wie vor allem auch Mitarbeiter im Gesundheitswesen mit Patientenkontakt). Der Schutz gegen Infektionen mit dem Coronavirus und auch gegen schwere Krankheitsverläufe nimmt innerhalb von 6 Monaten nach einer Coronaimpfung merklich ab und kann durch eine dann erfolgende „Boosterung“ wieder deutlich und längerfristig gesteigert werden. Es wird dafür der neue, gegen die Omikron-Varianten gerichtete Covid-19-Impfstoff ab 6 Monate nach der letzten Impfung oder Coronainfektion eingesetzt. Eine Corona-Infektion „zählt“ wie eine Auffrischungsimpfung, wenn der Abstand zur letzten Covid-19-Impfung mindestens 3 Monate beträgt.

Bei speziellen Gegebenheiten können Fragen zum individuellen Nutzen einer Auffrischungsimpfung durch die impfärztliche Beratung in den Impfstationen und bei den mobilen Impfaktionen geklärt werden. Die Covid-19-Infektionszahlen und damit das Erkrankungsrisiko nehmen derzeit wieder deutlich zu. Es ist daher für den Herbst und Winter ein robuster Corona-Impfschutz zur Vermeidung schwerer Krankheitsverläufe mit Krankenhaus- und Intensivbehandlungen entscheidend wichtig.

Grundimmunisierung (Erst- und Zweitimpfungen)

- bei Personen ab 12 Jahren sind zwei Dosen der mRNA-Impfstoffe Comirnaty® (bis 29 Jahre zu bevorzugen) im Abstand v. 3 Wochen oder Spikevax® (ab 30 Jahren) im Abstand von 4 Wochen erforderlich (bis zu einem Alter von 15 Jahren immer mit Anwesenheit eines/einer Sorgeberechtigten während der Impfung zusätzlich zur schriftlichen Einwilligung);
- bei Kindern von 5 bis 11 Jahren wird 1 Dosis des mRNA-Impfstoffs Comirnaty (10 µg) für Kinder von der STIKO empfohlen. Die 2. Dosis kann in Abhängigkeit vom weiteren Pandemieverlauf zu einem späteren Zeitpunkt nach Aussprechen einer entsprechenden Empfehlung durch die STIKO gegeben werden.

Auffrischungsimpfung (3. Impfung)

- Bei Personen, die mindestens 12 Jahre alt sind, wird regelhaft ab 6 Monaten nach Abschluss der Grundimmunisierung empfohlen (in der Altersgruppe von 12 bis einschl. 15 Jahren ist mit Anwesenheit eines/einer Sorgeberechtigten während der Impfung zusätzlich zur schriftlichen Einwilligung)

Auffrischungsimpfung (4. Impfung)

- regelhaft nach STIKO bei Personen ab 60 Jahren (6 Monate nach der 1. Auffrischungsimpfung). Jüngere können auf ausdrücklichen Wunsch nach impfärztlicher Beratung ebenfalls eine 4. Impfung erhalten, wenn die letzte Impfung mindestens 6 Monate zurückliegt;
- nach STIKO Tätige bzw. BewohnerInnen in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, ab 6 Monate nach der 1. Auffrischungsimpfung

- derzeit sind für gesunde Personen < 60 Jahren, bei denen ab 3 Monaten nach der 1. Auffrischungsimpfung eine Covid-19-Infektion aufgetreten ist, keine weitere Auffrischungsimpfung erforderlich.

Vorgehen bei Impfungen mit durchgemachten Covid-19-Infektionen

- In Fällen, bei denen während der Grundimmunisierungsphase vor oder nach einer Covid-19-Infektion eine Impfung gegen SARS-CoV-2 mit einem Abstand von unter 4 Wochen zwischen Impfung und Covid-19-Infektion durchgeführt wurde, werden beide Ereignisse wie 1 Immunisierung (also wie 1 Impfung o. wie 1 Infektion) gezählt. Der Abstand zwischen Infektion und anschließender Impfung soll im Regelfall 6 Monate betragen;
- Personen, die eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht haben und danach (Abstand ≥ 4 Wochen) schon eine Impfstoffdosis erhalten haben, sollen im Abstand von mind. 6 Monaten nach der vorangegangenen Impfung eine Auffrischungsimpfung erhalten;
- Personen, die nach COVID-19-Impfung (unabhängig von der Anzahl der Impfstoffdosen) eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, sollen im Abstand von mind. 6 Monaten nach Infektion eine Auffrischungsimpfung erhalten;
- Kinder von 5 bis 11 Jahren, auch ohne Vorerkrankungen, die bereits eine gesicherte SARSCoV-2-Infektion durchgemacht haben, sollen ab 3 Monate nach der Infektion eine zusätzliche Impfung mit 10 μg Comirnaty für Kinder[®] erhalten;
- Personen ≥ 12 Jahren, die eine gesicherte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, sollen zur Vervollständigung ihrer Grundimmunisierung bis auf weiteres eine einmalige Comirnaty[®]-Dosis für Erwachsene im Abstand von mindestens 3 Monaten zur Infektion erhalten und später eine Auffrischungsimpfung nach 6 Monaten.

Impfstoff

- Im Regelfall erhalten alle Impfungen zur Grundimmunisierung (Erst- und Zweitimpfungen) oder als Auffrischungsimpfung die Impfstoffe Comirnaty[®] von BioNTech/Pfizer oder Spikevax[®] von Moderna (erst ab 30 Jahre)
- bei unter 30-Jährigen sowie Schwangeren (ab 2. Trimenon) und stillenden Müttern zur Grundimmunisierung (ab 5 Jahren) oder als Auffrischungsimpfung (ab 12 Jahren) den Impfstoff Comirnaty[®] bzw. Comirnaty f. Kinder[®] von 5-11 Jahren von BioNTech/Pfizer;
- bei nicht abgeschlossener Grundimmunisierung (nur eine Dosis eines mRNA-Impfstoffes erhalten) wird möglichst der gleiche Impfstoff wie bei der Erstimpfung verwendet;

Bei allen mobilen Impfaktionen im Emsland steht ab Montag, 26. September, die neuen mRNA-Impfstoffe gegen die Omikron-Subvariante BA.1 und BA.4-5 des Coronavirus von BioNTech/Pfizer und Moderna (nur gegen BA.1) zur Verfügung. Damit werden alle Auffrischungsimpfungen für Personen ab zwölf Jahren durchgeführt.

Sollten sich die STIKO-Empfehlungen in der Zwischenzeit ändern, wird die Regelung ggf. angepasst.

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen zur Impfung mit:

1. Personalausweis
2. Impfpass (falls vorhanden)
3. Ausgefüllten Anamnese-Bogen mit Einwilligungserklärung und Aufklärungsbogen (bitte unterschreiben!), das spart Zeit bei der Impfung!
4. Allergie-Pass (falls vorhanden)
5. Medikamentenplan (z. B. wegen „Blutverdünner“)

Anamnese- und Aufklärungsbogen können Sie über die Website des Robert-Koch-Instituts herunterladen.

Für die Impfstoffe Spikevax[®] von Moderna und Comirnaty[®] von Biontech/Pfizer:

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Einwilligung-de.pdf?_blob=publicationFile

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf?_blob=publicationFile

Sollten Sie keinen Drucker haben, liegen einige Bögen bei der Impfung aus.

Die Unterlagen können in verschiedenen Sprachen heruntergeladen werden unter

<https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html>

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Samtgemeinde Nordhümmling, Tel. 05955-200-0.